

**KRITERIJAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS DARBUOTOJAMS  
ATLIEKAMI/NEATLIEKAMI SVEIKATOS PATIKRINIMAI (PGR arba antigeno  
greituoju testu/tyrimu), AR NESERGA COVID-19 LIGA**

Vakcina	COVID-19 liga	Terminai dėl periodinio darbuotojų testavimo
Pasiskiepijo „Comirnaty“ (2 dozės), „Spikevax“ (2 dozės) ar „Vaxzevria“ (2 dozės) vakcina pagal pilną vakcinavimo schemą.	Nesirgo	Testuotis nereikia praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo antrosios dozės suleidimo.
Pasiskiepijo „Comirnaty“ (2 dozės), „Spikevax“ (2 dozės) ar „Vaxzevria“ (2 dozės) vakcina pagal pilną vakcinavimo schemą	Sirgo	Terminas netaikomas. Testuotis nereikia.
Pasiskiepijo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcina	Nesirgo	Testuotis nereikia praėjus dviem savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo skiepo.
Pasiskiepijo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcina	Sirgo	Terminas netaikomas. Testuotis nereikia.
Pasiskiepijo pirma „Vaxzevria“ vakcinos doze	Nesirgo	Testuotis nereikia praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaitių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo.
Pasiskiepijo antra „Vaxzevria“ vakcinos doze pagal skiepijimo schemą .	Nesirgo	Testuotis nereikia praėjus ne daugiau kaip 210 dienų nuo antrosios dozės suleidimo.
Pasiskiepijo antra „Vaxzevria“ vakcinos doze pagal skiepijimo schemą .	Sirgo	Terminas netaikomas. Testuotis nereikia.
Pasiskiepijo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos viena doze.	Sirgo	Testuotis nereikia praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga.
Pasiskiepijo , kai pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai.	Nesirgo	Testuotis nereikia praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai.
Pasiskiepijo , kai pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai.	Sirgo	Terminas netaikomas. Testuotis nereikia.
Po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės.	Nesirgo/sirgo	Terminas netaikomas. Testuotis nereikia.
Nesiskiepijo.	Sirgo	Testuotis nereikia, jei nuo teigiamo COVID-19 ligos nustatymo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų.
Asmuo turi kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio antikūnų tyrimo teigiamą atsakymą. Nuo 2022 m. sausio 10 d. tyrimas <b>NEGALIOJA</b> asmenims, kurie paskiepyti pagal pilną vakcinacijos schemą.	Nesirgo/sirgo	Testuotis nereikia jei prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.

